



دولت استرالیا ی غربی
اداره صحت

قسمت صحتی برای افراد بومی و عمومی

برنامه واکسن مننژیت (ای-سی-دبلیو-وای) برای ایجاد مصونیت در صنف 10 مکتب ها سال 2018 (ACWY)

در هر سنی میتوان به بیماری مننژیت مبتلا شد. اگر چه، بیشترین حمل کنندگان مننژیت نوجوانان می باشند و این گروه سنی میتوانند میکرب را با افرادی که در معرض خطر بیشتری برای عفونت هستند مانند اطفال خرد منتقل کنند.

بنظر میرسد ایمن کردن شاگردان صنف 10 خطر انتقال میکرب را بدیگران کم کرده و از پخش عفونت در جامعه جلوگیری مینماید.

از چه واکسنی استفاده میشود و تا چه اندازه موثر است؟

از واکسن برای مننژیت (ای-سی-دبلیو-وای) استفاده میشود. این واکسن افراد را در مقابل چهار گروه میکرب که دارای یک آنتیژن هستند، (ای-سی-دبلیو-وای) حفاظت میکند. واکسنی که در برنامه مکتبها استفاده میشود، مخلوطی است از

Menveo که در استرالیا توسط کارخانه زیر

GlaxoSmithKline ساخته میشود و

Minerix که توسط کمپانی پفاایزر تهیه میگردد.

این واکسنها امن و موثر هستند.

برنامه واکسن گروه میکربهای (ای-سی-دبلیو-وای) در انگلیس از سال 2015 برای نوجوانان بین 13 تا 15 و در آمریکا برای سنین 11 - 12 از 2005 انجام شده است و هیچ اثر نگران کننده ای گزارش نشده است.

واکسن معمولا برای یک بار پیشنهاد میشود. دفعات بیشتر برای افرادی که در خطر هستند و آنها نیکه به جاهائی که این بیماری رایج است مسافرت میکنند، پیشنهاد میشود.

تحقیقات نشان داده واکسن (گروه - ای - سی - دبلیو - وای) بین 80 - 85 فی صد در نوجوانان موثر میباشد.

مننژیت چه نوع بیماری میباشد؟

مننژیت بیماری رایجی نیست، اگر چه گاهی اوقات این بیماری خطر جانی دارد. بیماری در اثر میکربی که باعث مسموم شدن خون و / یا ورم پرده هائی که در روی نخاع و مغز قرار دارد، ایجاد میگردد.

اگر چه با آنتی بیوتیک قابل معالجه است، عفونت میتواند خیلی سریع پیشرفت نماید، بنابراین بسیار اهمیت دارد که کسی که علائم مننژیت را دارد بطور عاجل از داکتر / شفاخانه کمک بگیرد.

در هر زمان تقریبا 10 فی صد از مردمان سالم میکرب مننژیت را در بینی و گلوی خود حمل میکنند بدون اینکه بیمار شوند.

چگونه به بیماری مننژیت مبتلا میشوید؟

میکرب مننژیت از طریق ترشحات دستگاه تنفسی (سرفه، عطسه و بوسیدن) پخش میشود. میکرب بیش از چند ثانیه در محیط زنده نمی ماند. امکان بسیار بلندی هست که بیماری از طریق تماس نزدیک منتقل شود، برای مثال کسانی که در یک خانه زندگی میکنند، رابطه جنسی و اطفالی که بیش از چهار ساعت در روز در کودکانستان بسر می برند.

چرا بهداری استرالیا ی غربی برنامه واکسن برای شاگردان صنف 10 را در نظر گرفته است؟

اخیرا مننژیت عفونی، که بوسیله گروه خاصی از میکربها (دبلیو)، بوجود میآید بسیار زیاد شده است.

چه کسی نباید واکسن بزند؟

اگر عکس العمل شدید وجود داشته باشد چه علائمی دارد؟

هر عکس العملی که شما را نگران کند، مانند حساسیت شدید، تب خیلی بلند، یا رفتار غیر عادی، علائم حساسیت شدید از جمله کهیر، ورم صورت و گلو، مشکل تنفس، بالا رفتن ضربان قلب، سرگیجه و بیحالی که معمولاً چند دقیقه یا چند ساعت پس از پیچکاری واکسن پیش می‌آید، آمبولانس خبر کنید یا به نزدیک‌ترین قسمت اورژانس شفاخانه مراجعه نمایید.

چه باید بکنم؟

پاراسیتومول می‌تواند در پائین آوردن درد یا تب کمک نماید و پارچه نم و خنک می‌تواند درد محل پیچکاری را کاهش دهد. لطفاً اگر عکس العملی دارید که فکر میکنید جدی و غیر منتظره است از داکتر کمک گرفته یا به قسمت اورژانس شفاخانه بروید.

یا با

Healthdirect Australia

شماره 1800022222 تماس بگیرید.

عکس العمل‌ها باید به " نظارت بر امنیت واکسن در استرالیا" غربی (دبلیو - آ - وی - اس - اس) خبر داده شود. کسانی که واکسن را بشما پیچکاری کرده اند باید گزارش دهند، یا شما می‌توانید از طریق سایت زیر گزارش دهید

www.wavss.health.wa.gov.au

یا با شماره تلفون 93211312 از 8.30 صبح تا 4.30 بعد از ظهر در طول هفته تماس بگیرید.

برای کسب معلومات بیشتر

اگر هر سوالی در مورد واکسن مننژیت دارید با

Healthdirect Australia

با شماره 1800022222 تماس بگیرید، جزئیات تماس در پشت پاکت ورقه رضایت‌نامه، نوشته شده است.

به پرستاری که واکسن را پیچکاری میکند اخبار دهید اگر:

حساسیت شدیدی دارید که جان شما را بخطر میاندازد.

اگر دفعه قبل که واکسن مننژیت از گروه (ای - سی - دبلیو - وای) پیچکاری کردید، حساسیت شدیدی که جان شما را بخطر انداخت داشتید. و یا حساسیت شدید به مواد موجود در آن دارید، نباید واکسن بزنید. کسی که واکسن را بشما میدهد میتواند محتویات واکسن را بشما بگوید.

حامله هستید و یا شیر می‌دهید

واکسن مننژیت معمولاً برای خانمهای باردار یا شیرده پیشنهاد نمیشود مگر آنکه داکتر پیشنهاد کند. لطفاً اگر باردار بوده یا شیر می‌دهید، با داکتر خانوادگی مشورت کنید.

اثرات جنبی واکسن چیست؟

در مورد هر دوائی منجمله واکسنها همیشه امکان عکس العمل‌های ناخوشایند معمولی وجود دارد. این علائم معمولاً ملایم بوده و از بین می‌روند. عکس العمل‌های شدید ممکن، ولی کمیاب میباشند. احتمال خیلی کم وجود دارد که واکسن باعث جراثحت شدید یا فوت شود. مننژیت عفونی نمیتواند توسط واکسن سرایت کند.

عکس العمل‌های ناخوشایند معمول مانند درد، سرخی و ورم کردن محل پیچکاری، تب، تحریک پذیری، سرگیجه، کم شدن اشتها، سردرد، کهیر و حالت تهوع میباشند. اگر چه، عکس العمل‌های شدید ناخوشایند کمیاب هستند.

ایمنی واکسنها همیشه تحت نظر میباشند. برای معلومات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

www.tga.gov.au

www.immunise.health.gov.au



این دوسیه را می‌توانید برای افراد معلول تقاضا کنید