



نيرسافيماب – ما يحتاج الأهل معرفته؟

صحيفة معلومات المستهلك

لماذا يجب أن تلقوا طفلكم ب نيرسافيماب؟

يمكن للجسم المضاد في نيرسافيماب منع الإصابة بداء رئوي حاد بسبب فيروس (آر أس في). تظهر الدراسات الطبية أن فعالية نيرسافيماب في الحؤول دون دخول الأطفال الرضع الذين يعيشون أول موسم لهم بالإصابة في (آر أس في) إلى المستشفى بسبب فيروس (آر أس في) تصل لما يقرب ٨٠ بالمئة، و٩٠ بالمئة في تلافي الدخول إلى وحدة العناية الفائقة.

من يُعد مؤهلاً للحصول على لقاح نيرسافيماب؟

طبقاً لهذا البرنامج، تعتبر الأفواج الأربعة أدناه مؤهلة للحصول على لقاح نيرسافيماب.

ابتداءً من ١ نيسان/ أبريل حتى ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤، سيتم تقديم نيرسافيماب:

- كبرنامج استلحاق للأطفال المولودين بين ١ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٢٣ و٣٠ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤
- لجميع أطفال السكان الأصليين بين ١ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٢٣ و٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤
- لبعض الأطفال المعرضين للخطر طبيًا في الموسم الثاني لعدوى (آر أس في) والمولودين بين ١ أكتوبر/ ٢٠٢٢ و٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٣ (سيعلمكم طبيب طفلكم إذا كان يجب على طفلكم أن يتلقى الجرعة).

بالإضافة:

- عند الولادة لجميع الأطفال المولودين بين ١ أيار/ مايو و٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤

ما هو الوقت الأمثل لتطعيم طفلكم ضد (آر أس في)؟

تجني جرعة نيرسافيماب الأطفال لمدة ٥ أشهر على الأقل، وهذا هو المعدل المعتاد لأمد موسم (آر أس في). يجب أن يتلقى الأطفال المولودون أثناء موسم (آر أس في) (عادةً من أيار/ مايو حتى أيلول/ سبتمبر في غرب أستراليا) جرعة وحيدة من نيرسافيماب قبل مغادرة مستشفى الولاد.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي (آر أس في)؟

(آر أس في) هو فيروس تنفسي شائع يتسبب عادة بأعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح ولكنه قد يتسبب أيضًا بأمراض أكثر خطور.

قد تتضمن أعراض الإصابة بفيروس (آر أس في) سيلان الأنف أو نقص الشهية أو السعال أو العطس أو الحمى أو الصفير عند التنفس.

ينتشر فيروس (آر أس في) بسهولة، ويصاب معظم الأطفال بفيروس (آر أس في) مع بلوغهم السنتين من العمر. بينما يتعافى أغلبية الأطفال في غضون أسبوع أو إثنين، يمكن للإصابة بفيروس (آر أس في) أن تكون خطيرة على الأطفال الصغار والرضع، مسببة صعوبة في التنفس وانخفاضًا في مستويات الأوكسجين وجفافًا.

في أستراليا، إن الإصابة بفيروس (آر أس في) هي السبب الأكثر شيوعًا لدخول الأطفال الرضع إلى المستشفيات لأنها غالبًا ما تتطور إلى التهاب رئوي (التهاب الرئتين) أو التهاب القصيبات الهوائية (التهاب في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين) لدى الأطفال الصغار جدًا. يدخل واحد من كل ٣٠ طفلًا كل سنة في غرب أستراليا (Western Australia) إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس (آر أس في) أثناء موسم المرض الشتوي.

ما هو نيرسافيماب؟

إن نيرسافيماب (بيفورتوس) هو دواء يحتوي على أجسام مضادة يمكنها منع الإصابة الخطيرة بمرض (آر أس في) بالنسبة إلى الأطفال الصغار والرضع، فالأجسام المضادة هي بروتينات يستخدمها الجسم لمحاربة الجراثيم الضارة. تحفز اللقاحات التقليدية الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي يمكنها توفير الحماية من مرض معين. وقد يستغرق ذلك بضعة أسابيع وقد يتطلب عدّة جرعات من اللقاح لضمان إنتاج أجسام مضادة كافية للحصول على الحماية. في المقابل، يحتوي دواء نيرسافيماب على أجسام مضادة مصنوعة سلفًا وموانعة للإصابة بفيروس (آر أس في) يمكنها توفير الحماية المباشرة للطفل تقريبًا وفورا بعد تناولها.

هل تراقب صحة غرب أستراليا WA Health سلامة اللقاحات؟

نعم. إن نظام الرقابة بشأن سلامة اللقاحات في غرب أستراليا (WAVSS) هو خدمة مركزية في غرب أستراليا للتبليغ عن أية آثار سلبية تلي إعطاء اللقاحات، وتشمل نيرسافيماب. إذا عانى طفلكم من أية تأثيرات جانبية مقلقة بعد تناوله لللقاح، يُرجى التبليغ عنها:

• www.safevac.org.au/Home/Info/WA
بمراسلة أو

• عبر الاتصال بـ WAVSS على الرقم: ٦٤٥٦ ٠٢٠٨ (٠٨) ٨:٣٠ صباحًا حتى ٤:٣٠ بعد الظهر، من الإثنين حتى الجمعة)

ماذا عليّ ابلاغ موفر الرعاية الصحية لطفلي قبل الحقنة؟

أخبر موفر الرعاية الصحية إذا كان طفلك:

- قد عانى من ردة فعل حساسية خطيرة لجرعة سابقة من دواءٍ يحتوي على أجسام مضادة
- لديه اضطراب نزفي
- يعاني حاليًا من مرضٍ متوسط أو خطر

يمكن للأطفال الذين يعانون من مرض بسيط، كالرشح، تلقي لقاح (آر أس في) بأمان. يجب على الأطفال المرضى بشكلٍ متوسطٍ أو خطر الانتظار حتى تماثلهم للشفاء. يستطيع موفر الرعاية الصحية لديك تزويدك بالمزيد من المعلومات عما هو الأفضل لطفلك.

كيف يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟



• اسأل موفر الرعاية الصحية لديك

• زُر www.healthywa.wa.gov.au/rsv

هل يمكن إعطاء نيرسافيماب في الوقت نفسه الذي تُعطى فيه لقاحات الطفولة الأخرى؟

يمكن إعطاء الأجسام المضادة الواقية لـ (آر أس في) في نيرسافيماب في الوقت نفسه الذي يُنصح فيه بإعطاء اللقاحات للأطفال الصغار والرضع بشكلٍ روتيني.

أين يتم تسجيل هذا اللقاح؟

عندما يتلقى طفلكم لقاح نيرسافيماب، يتم تدوين ذلك في سجل اللقاحات الأسترالي. يمكنكم الحصول على بيان سجل لقاحات طفلكم من موقع MyGov www.my.gov.au عبر الدخول إلى حساب Medicare الإلكتروني. (إذا لم يكن لديك حساب MyGov، ستحتاج لإنشاء هذا الحساب وربطه بـ).

ما هو خطر حدوث ردة فعلٍ على نيرسافيماب؟

في التجارب السريرية، لم تظهر آثار جانبية لدى معظم الأطفال الذين تلقوا نيرسافيماب. وبالرغم من عدم شيوعها، إن أكثر ردّات الفعل السلبية التي يُعلن عنها تكررًا هي الاحمرار والورم والألم مكان الحقنة والحرارة الطفيفة والطفح الجلدي. تكون معظم ردّات الفعل تقريبًا خفيفة وتختفي عادةً في غضون بضعة أيام. يمكنكم الاتصال بـ Healthdirect على الرقم ١٨٠٠٢٢٢٢٢ (متوفر ٢٤ ساعة في اليوم) للحصول على المشورة غير الملحة بشأن إدارة التأثيرات الجانبية عند الحاجة.

وبرغم المعدل المنخفض للتأثيرات الجانبية التي تلاحظها دراسات نيرسافيماب، من المهم أن نفهم أنه، كما هو الحال بالنسبة إلى أي دواء، ثمة احتمال ضئيل للغاية بحدوث ردة فعل ناتجة عن حساسية حادة تلي تناول الدواء. إن العيادات التي تُعطي اللقاحات مجهزة لإدارة ردّات فعل الحساسية النادرة جدًا ولكن من المحتمل أن تكون خطيرة، في حال حدوثها. يجب أن يدرك الأهل أيضًا أن ردة فعل الحساسية قد تبدأ بعد مغادرة الطفل للمستشفى أو العيادة. إذا رأيتم علامات ردة فعل حساسية خطيرة (على سبيل المثال، طفح جلدي أو ورم في الوجه أو في الحلق أو صعوبة في التنفس أو سرعة في دقات القلب أو الدوخة أو الضعف)، اتصلوا على الرقم ٠٠٠ وخذوا الطفل إلى أقرب مستشفى.

يمكن توفير هذه الوثيقة بأشكالٍ بديلةٍ

مُعد من إدارة التحكم بالأمراض المعدية
© وزارة الصحة 2024

إن حقوق نشر هذه الوثيقة منوطة حصراً بولاية غرب أستراليا ما لم يُذكر خلاف ذلك. مع مراعاة أحكام قانون حقوق النشر لسنة 1968 والتي تجيز التعامل العادل لغايات الدراسة الخاصة أو البحث أو النقد أو المراجعة والمسموح به، يمنع إعادة إنتاج أو استخدام أي جزءٍ من هذه الوثيقة لأية غايةٍ كانت بدون الحصول على إذنٍ خطيٍ من ولاية غرب أستراليا